

Рефнот® — новый иммуномодулятор для лечения онкологических больных



Значимым событием 2012 г. является регистрация нового показания у отечественного препарата Рефнот® для иммунотерапии онкологических больных. Это событие стало темой беседы медицинского редактора «МВ» Александра Рылова и академика РАН, профессора М.Р. ЛИЧИНИЦЕРА, заместителя директора по научной работе ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, руководителя отделения химиотерапии и комбинированных методов лечения злокачественных опухолей.

— Михаил Романович, Рефнот® вызывает все больший интерес у специалистов. С чем это связано?

— Рефнот® — рекомбинантный препарат фактора некроза опухоли в комбинации с тимозином-альфа1. Он является уни-

кальным по своему строению и обладает оригинальным механизмом действия. Препарат положительно влияет на содержание Т-лимфоцитов, активирует природные киллеры, обладает значительным эффектом на компоненты противоопухолевого и неспецифического иммунитета, обеспечивающие коррекцию и стимуляцию иммунитета у онкологических больных.

Рефнот® эффективен при сочетании с химиотерапией и при самостоятельном применении. На основании полученных клинических данных можно утверждать, что он усиливает эффективность химиотерапии. Так, например, при лечении диссеминированной меланомы кожи в сочетании с химиотерапией

зафиксировано увеличение частоты полных эффектов, у значительного числа больных отмечается длительная стабилизация болезни в течение 6 месяцев и более. Рефнот® способен оказывать лечебное воздействие на иммунитет при различных злокачественных опухолях. Этот препарат является новым важным компонентом комбинированного лечения онкологических больных.

Рефнот® эффективен при сочетании с химиотерапией и при самостоятельном применении. На основании полученных клинических данных можно утверждать, что он усиливает эффективность химиотерапии. Так, например, при лечении диссеминированной меланомы кожи в сочетании с химиотерапией отмечается увеличение частоты полных эффектов, у значительного числа больных зафиксирована длительная стабилизация болезни в течение 6 месяцев и более

Рефнот® хорошо переносится, побочные эффекты кратковременны, клинически не значимы и, как правило, не требуют лекарственной коррекции



— Что вы можете сказать по поводу побочных эффектов и о рациональных режимах использования Рефнота®?

— Рефнот® хорошо переносится, побочные эффекты кратковременны, клинически не значимы и, как правило, не требуют лекарственной коррекции. Рекомендовано несколько режимов лечения Рефнотом®. При комбинированном лечении в сочетании с химиотерапией Рефнот® вводится до каждого курса химиотерапии в течение 2–4 недель подкожно в дозе 100 000 ЕД 1 раз в день, 1–5 дней, затем 2 дня перерывы, или в дозе 400 000 ЕД 1 раз в сутки 3 раза в неделю. При самостоятельном использовании Рефнот® вводится подкожно в дозе 100 000 ЕД 1 раз в день, 1–5 дней, затем 2 дня перерывы, длительно.

— Скажите, пожалуйста, несколько слов о перспективах использования Рефнота® в онкологической практике.

— Мы надеемся, что Рефнот® войдет в стандарты лечения онкологических заболеваний, очень быстро станет доступным и его применение внесет значимый вклад в лечение онкологических больных.